

Pflanzenliste für oligolektische, sowie streng oligolektische Arten* der *Apoidae*

Nach Westrich (2018): Die Wildbienen Deutschlands, Verlag Eugen Ulmer, ISBN 978-3818601232 – zusammengestellt von F. Rothe

*Arten, die im Larvenstadium auf Pollen von nur wenigen oder einer einzigen Pflanzenart(en) angewiesen sind.

| Streng oligolektisch | | oligolektisch | |
|---|--|--|---|
| Pflanze | Wildbienenart | Pflanze | Wildbienenart |
| <i>Allium cepa</i> (Küchenzwiebel) | <i>Hylaeus punctulatissimus</i> | <i>Achillea filipendulina</i> (Gold-Schafgarbe) | <i>Colletes daviesanus</i> & <i>mlokossewiczii</i> <i>Heriades truncorum</i> <i>Hylaeus nigrinus</i> |
| <i>Allium giganteum</i> (Riesen-Lauch) | | <i>Achillea millefolium</i> (Wiesen-Schafgarbe) | <i>Andrena denticulata</i> <i>Colletes daviesanus, fodiens</i> & <i>similis</i> <i>Heriades truncorum</i> <i>Hylaeus nigrinus</i> <i>Osmia spinulosa</i> |
| <i>Allium montanum</i> (Berg-Lauch) | | <i>Acinos arvensis</i> (Steinquendel) | <i>Osmia andrenoides</i> |
| <i>Allium porrum</i> (Küchenlauch) | | <i>Aegopodium podagraria</i> (Giersch) | <i>Andrena proxima</i> & <i>rosae</i> |
| <i>Allium sphaerocephalon</i> (Kugellauch) | | <i>Ajuga genevensis</i> (Genfer Günsel) | <i>Osmia andrenoides</i> |
| <i>Anchusa officinalis</i> (Gew. Ochsenzunge) | <i>Andrena nasuta</i> ; <i>Colletes nasutus</i> | <i>Alcea rosea</i> (Stockrose) | <i>Eucera macroglossa</i> |
| <i>Asparagus officinalis</i> (Spargel) | <i>Andrena chrysopus</i> | <i>Althea officinalis</i> (Echter Eibisch) | <i>Eucera macroglossa</i> |
| <i>Bryonia alba</i> (WeißeZaunrübe) | <i>Andrena florea</i> | <i>Alyssum montanum</i> (Berg-Steinkraut) | <i>Andrena lagopus</i> & <i>tscheki</i> |
| <i>Bryonia dioica</i> (Zweihäusige Zaunrübe) | | <i>Alyssum saxatile</i> (Felsen-Steinkraut) | <i>Andrena tscheki</i> |
| <i>Campanula bononiensis</i> (Bologneser Glockenbl.) | <i>Chelostoma campanularum</i> , <i>distinctum</i> & <i>rapunculi</i> ; <i>Melitta haemorrhoidalis</i> | <i>Angelica sylvestris</i> (Wald-Engelwurz) | <i>Andrena nitiduscula</i> & <i>rosae</i> |
| <i>Campanula carpatica</i> (Karpaten-Glockenbl.) | <i>Chelostoma rapunculi</i> | <i>Anthemis arvensis</i> (Acker-Hundskamille) | <i>Colletes daviesanus</i> <i>Heriades truncorum</i> <i>Hylaeus nigrinus</i> <i>Osmia spinulosa</i> |
| <i>Campanula cochleariifolia</i> (Zwerg-Glockenbl.) | <i>Dufourea dentiventris</i> | <i>Anthemis tinctoria</i> (Färberkamille) | <i>Colletes daviesanus, fodiens</i> & <i>similis</i> <i>Heriades truncorum</i> <i>Hyleus nigrinus</i> <i>Osmia spinulosa</i> |

| Streng oligolektisch | | oligolektisch | |
|---|---|---|--|
| Pflanze | Wildbienenart | Pflanze | Wildbienenart |
| <i>Campanula glomerata</i> (Büschel-Glockenbl.) | <i>Andrena curvungula</i> <i>Andrena pandellei</i> <i>Chelostoma rapunculi</i> <i>Dufourea dentiventris</i> <i>Lasioglossum costulatum</i> <i>Osmia mitis</i> | <i>Anthriscus sylvestris</i> (Wiesen-Kerbel) | <i>Andrena proxima & rosae</i> |
| <i>Campanula isophylla</i> | <i>Chelostoma rapunculi</i> | <i>Anthyllis vulneraria</i> (Gew. Wundklee) | <i>Eucera nigrescens</i> |
| <i>Campanula patula</i> (Wiesen-Glockenblume) | <i>Andrena curvungula</i> <i>Andrena pandellei</i> <i>Andrena rufizona</i> <i>Osmia mitis</i> | <i>Aster amellus</i> (Herbst-Aster) | <i>Osmia spinulosa</i> |
| <i>Campanula persicifolia</i> (Pfersichbl.-Glockenbl.) | <i>Andrena curvungula</i> <i>Andrena pandellei</i> <i>Chelostoma campanularum</i> & <i>rapunculi</i> <i>Lasioglossum costulatum</i> <i>Melitta haemorrhoidalis</i> | <i>Astragalus onobrychis</i> (Espargetten-Tragant) | <i>Melitturga clavicornis</i> |
| <i>Campanula rapunculoides</i> (Acker-Glockenbl.) | <i>Andrena rufizona</i> <i>Chelostoma campanularum</i> , <i>distinctum</i> & <i>rapunculi</i> <i>Lasioglossum costulatum</i> <i>Melitta haemorrhoidalis</i> | <i>Aubrieta deltoidea</i> (Blaukissen) | <i>Andrena tscheki</i> |
| <i>Campanula rapunculus</i> (Rapunzel-Glockenbl.) | <i>Andrena curvungula</i> <i>Andrena pandellei</i> <i>Chelostoma campanularum</i> <i>Lasioglossum costulatum</i> <i>Melitta haemorrhoidalis</i> | <i>Ballota nigra</i> (Schwarznessel) | <i>Anthophora furcata</i> <i>Rophites quinquespinosus</i> |
| <i>Campanula rotundifolia</i> (Rundbl.-Glockenbl.) | <i>Andrena curvungula</i> & <i>pandellei</i> <i>Chelostoma campanularum</i> , <i>distinctum</i> & <i>rapunculi</i> <i>Dufourea dentiventris</i> & <i>inermis</i> <i>Lasioglossum costulatum</i> <i>Melitta haemorrhoidalis</i> <i>Osmia mitis</i> | <i>Barbarea vulgaris</i> (Echtes Barbarakraut) | <i>Andrena agilissima</i> , <i>distinguenda</i> , <i>lagopus</i> & <i>tscheki</i> <i>Osmia brevicornis</i> |
| <i>Campanula sibirica</i> (Sibirische-Glockenbl.) | <i>Andrena curvungula</i> , <i>pandellei</i> & <i>paucisquama</i> <i>Lasioglossum costulatum</i> | <i>Betonica officinalis</i> (Heilziest) | <i>Anthophora furcata</i> <i>Rophites algius</i> <i>Rophites quinquespinosus</i> |
| <i>Campanula trachelium</i> (Nesselbl-Glockenbl.) | <i>Andrena rufizona</i> <i>Chelostoma campanularum</i> & <i>rapunculi</i> <i>Dufourea dentiventris</i> & <i>inermis</i> <i>Lasioglossum costulatum</i> <i>Melitta haemorrhoidalis</i> <i>Osmia mitis</i> | <i>Brassica napus</i> (Raps) | <i>Andrena agilissima</i> , <i>distinguenda</i> , <i>lagopus</i> , <i>niveata</i> & <i>suerinensis</i> <i>Osmia brevicornis</i> |
| <i>Carduus nutans</i> (Nickende Distel) | -> <i>Xylocopa violacea</i> | <i>Brassica nigra</i> (Schwarzer Senf) | <i>Osmia brevicornis</i> |

| Streng oligolektisch | | oligolektisch | |
|---|---|---|--|
| Pflanze | Wildbienenart | Pflanze | Wildbienenart |
| <i>Cerithe major</i> (Große Wachsblume) | <i>Osmia cerinthidis</i> | <i>Brassica oleracea</i> (Gemüse-Kohl) | <i>Andrena agilissima,</i> <i>sidtinguenda</i> & <i>suerinensis</i> <i>Osmia brevicornis</i> |
| <i>Cerithe minor</i> (Kleine Wachsblume) | | <i>Brassica rapa</i> (Rübsen) | |
| <i>Chamaecytisus purpureus</i> (Purpur-Geißklee) | <i>Andrena aberrans</i> | <i>Bupthalam speciosum</i> (Telekie) | <i>Heriades truncorum</i> |
| <i>Chamaecytisus ratisbonensis</i> (Regensburger Geißklee) | | <i>Bupthalam salicifolium</i> (Weidenbl. Ochsenauge) | <i>Heriades truncorum</i> <i>Osmia leaiana</i> & <i>spinulosa</i> |
| <i>Convolvulus arvensis</i> (Acker-Winde) | <i>Systropha curvicornis</i> <i>Systropha planidens</i> | <i>Calendula officinalis</i> (Garten-Ringelblume) | <i>Heriades truncorum</i> <i>Osmia spinulosa</i> |
| <i>Echium plantagineum</i> (Violetter Natternkopf) | <i>Osmia adunca</i> | <i>Calluna vulgaris</i> (Heidekraut) | <i>Andrena fuscipes</i> <i>Colletes succinctus</i> |
| <i>Echium vulgare</i> (Gew. Natternkopf) | <i>Osmia adunca,</i> <i>anthocopoides, lepeletieri</i> | <i>Campanula cervicaria</i> (Borstige Glockenbl.) | <i>Chelostoma rapunculi</i> |
| <i>Hedera helix</i> (Efeu) | <i>Colletes hederæ</i> | <i>Campanula latifolia</i> (Breitbl. Glockenbl.) | |
| <i>Jasione montana</i> (Berg-Sandrapunzel) | <i>Dufourea halictula</i> <i>Lasioglossum costulatum</i> | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (Hirtentäschel) | <i>Andrena distinguenda</i> & <i>tscheki</i> |
| <i>Lamium album</i> (Weiße Taubnessel) | -> <i>Xylocopa violacea</i> | <i>Cardamine pratensis</i> (Wiesen-Schaumkraut) | <i>Andrena lagopus</i> & <i>tscheki</i> |
| <i>Lamium purpureum</i> (Rote taubnessel) | | <i>Cardaria draba</i> (Pfeilkresse) | <i>Andrena disinguenda</i> & <i>niveata</i> |
| <i>Lathyrus linifolius</i> (Berg-Platterbse) | <i>Andrena lathyri</i> | <i>Carduus acanthoides</i> (Weg-Distel) | <i>Eucera dentata</i> |
| <i>Lathyrus pratensis</i> (Wiesen-Platterbse) | | <i>Carduus crispus</i> (Krause Distel) | <i>Heriades truncorum</i> <i>Osmia fulviventris, leaiana</i> & <i>spinulosa</i> |
| <i>Lathyrus vernus</i> (Frühlings-Platterbse) | | <i>Carduus defloratus</i> (Alpen-Distel) | <i>Osmia fulviventris</i> & <i>villosa</i> |
| <i>Linum flavum</i> (Gelber Lein) | <i>Osmia mocsaryi</i> | <i>Carduus nutans</i> (Nickende Distel) | <i>Osmia fulviventris</i> & <i>leaiana</i> |
| <i>Lysimachia nummularia</i> (Pfennig-Gilbweiderich) | <i>Macropis fulvipes</i> | <i>Centaurea jacea</i> (Wiesen-Flockenbl.) | <i>Andrena denticulate</i> & <i>fulvago</i> <i>Anthidium nanum</i> <i>Dasypoda hirtipes</i> <i>Osmia fulviventris, leaiana</i> & <i>spinulosa</i> |
| <i>Lysimachia punctata</i> (Drüsiger-Gilbweiderich) | <i>Macropis europaea</i> <i>Macropis fulvipes</i> | <i>Centaurea pseudophrygia</i> (Perücken-Flockenbl.) | <i>Osmia villosa</i> |
| <i>Lysimachia vulgaris</i> (Gew. Gilbweiderich) | | <i>Centaurea scabiosa</i> (Skabiosen-Flockenbl.) | <i>Anthidium nanum</i> <i>Dasypoda hirtipes</i> <i>Eucera dentata</i> <i>Heriades crenulatus</i> <i>Hylaeus nigrinus</i> <i>Osmia fulviventris</i> & <i>spinulosa</i> |

| Streng oligolektisch | | oligolektisch | |
|--|--|--|--|
| Pflanze | Wildbienenart | Pflanze | Wildbienenart |
| <i>Lythrum salicaria</i> (Blutweiderich) | <i>Eucera salicariae</i> <i>Melitta nigricans</i> | <i>Centaurea stoebe</i> (Rispen-Flockenbl.) | <i>Andrena denticulate</i> <i>Anthidium nanum & tenellum</i> <i>Dasypoda hirtipes</i> <i>Eucera dentata</i> <i>Heriades crenulatus & truncorum</i> <i>Osmia fulviventris</i> |
| <i>Odontites luteus</i> (Gelber Zahntrost) | <i>Melitta tricincta</i> | <i>Chaerophyllum aureum</i> (Gold-Kälberkropf) | <i>Andrena proxima</i> |
| <i>Odontites vulgaris</i> (Roter Zahntrost) | | <i>Chaerophyllum temulum</i> (Hecken-Kälberkropf) | |
| <i>Onobrychis arenaria</i> (Sand-Esparsette) | <i>Melitta dimidiata</i> | <i>Chamaespartium sagittale</i> (Flügel-Ginster) | <i>Andrena wilkella</i> |
| <i>Onobrychis montana</i> (Berg-Esparsette) | | <i>Cheiranthus cheiri</i> (Goldlack) | <i>Osmia brevicornis</i> |
| <i>Onobrychis viciifolia</i> (Futter-Esparsette) | | <i>Chondrilla juncea</i> (Binsen-Knorpelsalat) | <i>Dasypoda hirtipes</i> |
| <i>Potentilla arenaria</i> (Sand-Fingerkraut) | <i>Andrena potentillae</i> | <i>Chicorium intybus</i> (Wegwarte) | <i>Andrena denticulate & polita</i> <i>Dasypoda hirtipes</i> <i>Heriades truncorum</i> <i>Osmia leaiana, spinulosa & villosa</i> <i>Panurgus banksianus, calcaratus & dentipes</i> |
| <i>Potentilla neumanniana</i> (Frühlings-Fingerkraut) | | <i>Cirsium arvense</i> (Acker-Kratzdistel) | <i>Osmia fulviventris, leaiana & spinulosa</i> |
| <i>Potentilla anserine</i> (Gänse-Fingerkraut) | <i>Andrena tarsata</i> | <i>Cirsium vulgare</i> (Gew. Kratzdistel) | <i>Andrena denticulate</i> <i>Anthidium nanum & tenellum</i> <i>Dasypoda hirtipes</i> <i>Heriades crenulatus & truncorum</i> <i>Osmia fulviventris, leaiana, spinulosa & villosa</i> |
| <i>Potentilla erecta</i> (Blutwurz) | | <i>Clinopodium vulgare</i> (Wirbeldost) | <i>Rophites algirus</i> |
| <i>Potentilla fruticosa</i> (Strauch-Fingerkraut) | | <i>Conium maculatum</i> (Schierling) | <i>Andrena proxima</i> |
| <i>Potentilla grandiflora</i> (Großbl. Fingerkraut) | | <i>Crepis spec.</i> (Pippau) | <i>Panurgus banksianus</i> |
| <i>Potentilla reptans</i> (Kriechendes Fingerkraut) | | <i>Crepis biennis</i> (Wiesen-Pippau) | <i>Andrena fulvago, humilis & rhenana</i> <i>Osmia fulviventris, leaiana, spinulosa & villosa</i> |
| <i>Ranunculus acris</i> (Scharfer Hahnenfuß) | <i>Chelostoma florisomne</i> | <i>Crepis capillaris</i> (Grüner Pippau) | <i>Andrena fulvago</i> <i>Heriades truncorum</i> <i>Panurgus calcaratus & dentipes</i> |

| Streng oligolektisch | | oligolektisch | |
|--|------------------------------------|--|---|
| Pflanze | Wildbienenart | Pflanze | Wildbienenart |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> (Knolliger Hahnenfuß) | | <i>Cytisus nigricans</i> (Schwarzwerdender Geißklee) | <i>Megachile ericetorum</i> |
| <i>Ranunculus lanuginosus</i> (Wolliger Hahnenfuß) | | <i>Cytisus scoparius</i> (Besenginster) | <i>Andrena wilkella</i> |
| <i>Ranunculus polyanthemos</i> (Vielbl. Hahnenfuß) | | <i>Daucus carota</i> (Wilde Möhre) | <i>Andrena nitidiuscula,</i> <i>pallitarsis, proxima & rosae</i> |
| <i>Ranunculus reptans</i> (Kriechender Hahnenfuß) | | <i>Dorycnium germanicum</i> (Deutscher Backenklee) | <i>Melitta leporina</i> |
| <i>Reseda lutea</i> (Wilde Resede) | <i>Hylaeus signatus</i> | <i>Erica cinerea</i> (Graue Glockenheide) | <i>Colletes succinctus</i> |
| <i>Reseda luteola</i> (Färber-Resede) | | <i>Erigeron annuus</i> (Einj. Feinstrahl) | <i>Heriades truncorum</i> <i>Colletes fodiens</i> |
| <i>Reseda odorata</i> (Garten-Resede) | | <i>Eryngium campestre</i> (Feld-Mannstreu) | <i>Andrena nuptialis & rosae</i> |
| <i>Salix</i> -Arten <i>S. alsba, aurita, caprea,</i> <i>cinerea, fragilis, purpurea</i> <i>etc.</i> | verschiedene <i>Andrena</i> -Arten | <i>Eryngium planum</i> (Flachbl. Mannstreu) | <i>Andrena rosae</i> |
| <i>Symphytum officinale</i> (Gew. Beinwell) | <i>Andrena symphyti</i> | <i>Erysium crepidifolium</i> (Bleicher Schöterich) | <i>Osmia brevicornis</i> |
| <i>Symphytum tuberosum</i> (Knoten-Beinwell) | | <i>Erysium odoratum</i> (Duft-Schöterich) | |
| <i>Vaccinium myrtillus</i> (Heidelbeere) | <i>Andrena tapponica</i> | <i>Erysium rhaeticum</i> (Schweizer Schöterich) | |
| <i>Vaccinium uliginosum</i> (Moorbeere) | | <i>Falcaria vulgaris</i> (Sichelmöhre) | <i>Andrena nitidiuscula,</i> <i>pallitarsis, proxima & rosae</i> |
| <i>Vaccinium vitis-idea</i> (Preiselbeere) | | <i>Galatella linosyris</i> (Gold-Aster) | <i>Colletes collaris</i> |
| <i>Veronica chamaedrys</i> (Gamander-Ehrenpreis) | <i>Andrena viridescens</i> | <i>Genista anglica</i> (Englischer Ginster) | <i>Andrena similis</i> |
| <i>Veronica teuricum</i> (Großer Ehrenpreis) | | <i>Helianthemum apenninum</i> (Apenninen-Sonnenröschen) | <i>Andrena granulosa</i> |
| <i>Vicia cracca</i> (Vodel-Wicke) | <i>Andrena lathyri</i> | <i>Helianthemum canum</i> (Graues Sonnenröschen) | |
| <i>Vicia sepium</i> (Zaun-Wicke) | | <i>Helianthemum nummularium</i> (Gew. Sonnenröschen) | |
| | | <i>Helichrysum arenarium</i> (Sand-Strohblume) | <i>Colletes daviesanus & fodiens</i> |
| | | <i>Helichrysum thianshanicum</i> | <i>Colletes daviesanus</i> |
| | | <i>Heracleum sphondylium</i> (Wiesen-Bärenklau) | <i>Andrena nitidiuscula,</i> <i>proxima & rosae</i> |
| | | <i>Hesperus matronalis</i> (Gew. Nachtviole) | <i>Osmia brevicornis</i> |

| Streng oligolektisch | | oligolektisch | |
|---|---|--|---|
| Pflanze | Wildbienenart | Pflanze | Wildbienenart |
| <i>Hieracium spec.</i> (Habichtskraut) | <i>Osmia fulviventris & leaiana</i> | <i>Hippocrepis comosa</i> (Hufeisenklee) | <i>Osmia gallarum & ravouxi</i> |
| <i>Hieracium lachenalii</i> (Lachenals Habichtskraut) | <i>Andrena humilis</i> | <i>Hypochaeris glabra</i> (Kahles Ferkelkraut) | <i>Dufourea vulgaris</i> |
| <i>Hieracium pilosella</i> (Kleines Habichtskraut) | <i>Andrena fulvago, humilis & polita</i> <i>Dasypoda hirtipes</i> <i>Dufourea vulgaris</i> <i>Osmia spinulosa & villosa</i> <i>Panurgus banksianus & calcaratus</i> | <i>Hypochaeris radicata</i> (Gew. Ferkelkraut) | <i>Andrena denticulate, fulvago, humilis & polita</i> <i>Dasypoda hirtipes</i> <i>Dufourea vulgaris</i> <i>Heriades truncorum</i> <i>Osmia leaiana</i> <i>Panurgus banksianus, calcaratus & dentipes</i> |
| <i>Hieracium piloselloides</i> (Florentiner Habichtskraut) | <i>Andrena polita</i> | <i>Hypochaeris maculata</i> (Geflecktes Ferkelkraut) | <i>Osmia fulviventris</i> |
| <i>Hieracium sabaudum</i> (Savoyer Habichtskraut) | <i>Panurgus dentipes</i> | <i>Inula britannica</i> (Wiesen-Alant) | <i>Colletes fodiens</i> <i>Heriades truncorum</i> <i>Osmia spinulosa</i> |
| <i>Hieracium umbellatum</i> (Doldiges Habichtskraut) | <i>Andrena denticulate</i> <i>Dasypoda hirtipes</i> <i>Dufourea vulgaris</i> <i>Panurgus banksianus, calcaratus & dentipes</i> | <i>Inula ensifolia</i> (Schwert-Alant) | <i>Heriades truncorum</i> <i>Osmia spinulosa</i> |
| <i>Isatis tinctoria</i> (Färber-Waid) | <i>Andrena distinguenda</i> | <i>Inula helenium</i> (Echter Alant) | <i>Heriades truncorum</i> |
| <i>Knautia arvensis</i> (Wiesen-Witwenblume) | <i>Andrena hattorfiana & marginata</i> <i>Dasypoda suripes</i> | <i>Inula hirta</i> (Rauher Alant) | <i>Heriades truncorum</i> <i>Osmia spinulosa</i> |
| <i>Knautia drymeia</i> (Balkan-Witwenblume) | <i>Andrena hattorfiana</i> | <i>Inula salicina</i> (Weiden-Alant) | <i>Colletes similis</i> <i>Heriades crenulatus & truncorum</i> <i>Osmia spinulosa</i> |
| <i>Knautia maxima</i> (Wald-Witwenblume) | | <i>Lactuca perennis</i> (Blauer Lattich) | <i>Andrena polita</i> |
| <i>Lathyrus heterophyllus</i> (Verschiedenbl. Platterbse) | <i>Anthidium byssinum</i> <i>Megachile ericetorum</i> | <i>Lapsana communis</i> (Rainkohl) | <i>Andrena fulvago</i> |
| <i>Lathyrus latifolius</i> (Ranken-Platterbse) | <i>Megachile ericetorum</i> <i>Osmia tridentata</i> | <i>Laserpitium latifolium</i> (Breitbl. Laserkraut) | <i>Andrena proxima</i> |
| <i>Lathyrus odoratus</i> (Gartenwicke) | <i>Megachile ericetorum</i> | <i>Lavatera thuringiaca</i> (Thüringer Strauchpappel) | <i>Eucera macroglossa</i> |
| <i>Lathyrus sylvestris</i> (Wald-Platterbse) | <i>Anthidium byssinum</i> <i>Eucera longicornis</i> <i>Megachile ericetorum</i> <i>Melitturga clavicornis</i> <i>Osmia acuticornis & tridentata</i> | <i>Leontodon autumnalis</i> (Herbst-Löwenzahn) | <i>Andrena denticulate & polita</i> <i>Dasypoda hirtipes</i> <i>Dufourea vulgaris</i> <i>Heriades truncorum</i> <i>Osmia spinulosa</i> <i>Panurgus banksianus, calcaratus & dentipes</i> |

| Streng oligolektisch | | oligolektisch | |
|--|---|---|---|
| Pflanze | Wildbienenart | Pflanze | Wildbienenart |
| <i>Lathyrus tuberosus</i> (Knollen-Platterbse) | <i>Anthidium byssinum</i> <i>Eucera interrupta</i> & <i>longicornis</i> <i>Megachile ericetorum</i> <i>Osmia acuticornis</i> & <i>tridentata</i> | <i>Leontodon hispidus</i> (Rauher Löwenzahn) | <i>Andrena fulvago</i> & <i>humilis</i> <i>Osmia villosa</i> |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> (Wiesen-Margerite) | <i>Colletes daviesanus</i> <i>Hylaeus nigritus</i> | <i>Lotus corniculatus</i> (Gew. Hornklee) | <i>Andrena similis, wilkella</i> <i>Anthidium byssinum</i> <i>Eucera interrupta</i> & <i>longicornis</i> <i>Megachile ericetorum</i> <i>Melitturga clavicornis</i> <i>Osmia acuticornis, gallarum,</i> <i>loti, ravouxi, tridentata</i> & <i>xanthomelana</i> |
| <i>Lunaria annua</i> (Garten-Silberblatt) | <i>Osmia brevicornis</i> | <i>Lotus pedunculatus</i> (Sumpf-Hornklee) | <i>Andrena wilkella</i> <i>Anthidium byssinum</i> |
| <i>Lunaria rddiviva</i> (Wildes Silberblatt) | | <i>Lupinus polyphyllos</i> (Vielbl. Lupine) | <i>Megachile ericetorum</i> |
| <i>Malva</i> -Arten | <i>Eucera macroglossa</i> | <i>Medicago falcate</i> (Luzerne) | <i>Andrena wilkella</i> <i>Anthidium byssinum</i> <i>Colletes marginatus</i> <i>Eucera longicornis</i> & <i>nigricens</i> <i>Melitta leporine</i> <i>Melitturga clavicornis</i> <i>Osmia acuticornis</i> & <i>tridentata</i> <i>Rhophites canus</i> |
| <i>Matricaria recutita</i> (Echte Kamille) | <i>Hylaeus nigritus</i> | <i>Melilotus albus</i> (Weißer Steinklee) | <i>Andrena wilkella</i> <i>Colletes marginatus</i> <i>Megachile ericetorum</i> <i>Melitta leporina</i> <i>Melitturga clavicornis</i> <i>Osmia tridentata</i> |
| <i>Nepeta grandiflora</i> (Großblütige Katzenminze) | <i>Anthophora furcata</i> | <i>Melilotus officinalis</i> (Echter Steinklee) | <i>Colletes marginatus</i> <i>Melitta leporina</i> |
| <i>Nepeta x fassenii</i> (Garten-Katzenminze) | | <i>Onopordum acanthium</i> (Gew. Eselsdistel) | <i>Anthidium nanum</i> <i>Eucera dentata</i> <i>Heriades crenulatus</i> <i>Osmia fulviventris</i> & <i>leaiana</i> |
| <i>Ononis repens</i> (Kriechende Hauhechel) | <i>Anthidium byssinum</i> <i>Megachile ericetorum</i> | <i>Orlaya grandiflora</i> (Großblütiger Breitsame) | <i>Andrena proxima</i> |
| <i>Ononis spinosa</i> (Dornige Hauhechel) | <i>Andrena wilkella</i> <i>Anthidium byssinum</i> <i>Megachile ericetorum</i> | <i>Ornithogalum umbellatum</i> (Dolden-Milchstern) | <i>Andrena saxonica</i> |
| <i>Pastinaca sativa</i> (Pastinak) | <i>Andrena pallitarsis</i> <i>Andrena rosae</i> | <i>Peucedanum cervaria</i> (Hirsch-Haarstrang) | <i>Andrena nitidiuscula</i> <i>Andrena nuptialis</i> |

| Streng oligolektisch | | oligolektisch | |
|--|---|---|--|
| Pflanze | Wildbienenart | Pflanze | Wildbienenart |
| <i>Phaseolus coccineus</i> (Feuerbohne) | <i>Megachile ericetorum</i> | <i>Peucedanum oreoselinum</i> (Berg-Haarstrang) | <i>Andrena nitidiuscula</i> |
| <i>Phyteuma orbiculare</i> (Kugel-Teufelskralle) | <i>Andrena curvungula</i> <i>Dufourea dentiventris</i> <i>Melitta haemorrhoidalis</i> | <i>Picris echioides</i> (Wurmlattich) | <i>Panurgus calcaratus</i> |
| <i>Pisum sativum</i> (Felderbse) | <i>Megachile ericetorum</i> | <i>Picris hieracioides</i> (Gew. Bitterkraut) | <i>Andrena denticulata & polita</i> <i>Colletes halophilus</i> <i>Dasypoda hirtipes</i> <i>Dufourea vulgaris</i> <i>Heriades crenulatus & truncorum</i> <i>Osmia fulviventris, leiana, spinulosa & villosa</i> <i>Panurgus banksianus, calcaratus & dentipes</i> |
| <i>Pulicaria dysenterica</i> (Großes Flohkraut) | <i>Andrena denticulate</i> <i>heriades crenulatus & truncorum</i> <i>Osmia spinulosa</i> | | |
| <i>Raphanus raphanistrum</i> (Hederich) | <i>Andrena agilissima, distinguenda, niveata & suerinensis</i> | <i>Rudbeckia laciniata</i> (Schlitzblättriger Sonnenhut) | <i>Heriades truncorum</i> |
| <i>Salvia spec.</i> (Salbei) | <i>Osmia andrenoides</i> | <i>Scabiosa canescens</i> (Graue Skabiose) | <i>Andrena marginata</i> |
| <i>Scorzonera austriaca</i> (Österr. Schwarzwurzel) | <i>Andrena taraxaci</i> | <i>Scabiosa columbaria</i> (Taubenskabiose) | <i>Andrena hattorfiana & marginata</i> |
| <i>Scorzonera humilis</i> (Niedrige Schwarzwurzel) | <i>Andrena fulvago</i> <i>Panurgus banksianus</i> | <i>Scabiosa ochroleuca</i> (Gelbe Skabiose) | <i>Andrena marginata</i> <i>Dasypoda argentata</i> |
| <i>Securigera varia</i> (Bunte Kronwicke) | <i>Anthidium byssinum</i> <i>Megachile ericetorum</i> | <i>Senecio jacobaea</i> (Jakobs-Greiskraut) | <i>Andrena denticulata</i> <i>Colletes fodiens</i> <i>Heriades truncorum</i> <i>Osmia spinulosa</i> |
| <i>Sinapis alba</i> (Weißer Senf) | <i>Andrena agilissima & suerinensis</i> <i>Osmia brevicornis</i> | <i>Senecio vulgaris</i> (Gew. Greiskraut) | <i>Andrena denticulate</i> <i>Heriades truncorum</i> |
| <i>Sinapis arvensis</i> (Acker-Senf) | <i>Andrena agilissima, distinguenda, lagopus, niveata & suerinensis</i> <i>Osmia brevicornis</i> | <i>Sisymbrium officinale</i> (Weg-Rauke) | <i>Andrena niveata</i> |
| <i>Sinapis nigra</i> (Schwarzer Senf) | <i>Andrena niveata</i> | <i>Sisymbrium orientale</i> (Orientalische Rauke) | <i>Andrena niveata, suerinensis & tscheki</i> <i>Osmia brevicornis</i> <i>Panurgus labiatus</i> |
| <i>Solidago canadensis</i> (Kanad. Goldrute) | <i>Andrena denticulate</i> <i>Colletes collaris & similis</i> <i>Hylaeus nigrinus</i> | <i>Sonchus arvensis</i> (Acker-Gänsedistel) | <i>Colletes halophilus</i> <i>Dasypoda hirtipes</i> <i>Heriades truncorum</i> |
| <i>Solidago gigantea</i> (Riesen-Goldrute) | <i>Colletes collaris & similis</i> | <i>Sonchus asper</i> (Rauhe Gänsedistel) | <i>Dasypoda hirtipes</i> |
| <i>Solidago virgaurea</i> (Gew. Goldrute) | <i>Andrena denticulata</i> | <i>Stachys byzantine</i> (Woll-Ziest) | <i>Anthophora furcata</i> |

| Streng oligolektisch | | oligolektisch | |
|--|--|---|---|
| Pflanze | Wildbienenart | Pflanze | Wildbienenart |
| <i>Succisa pratensis</i> (Gew. Teufelsabbiss) | <i>Andrena marginata</i> <i>Dasypoda argentata</i> | <i>Stachys palustris</i> (Sumpf-Ziest) | <i>Anthophora furcata</i> <i>Rophites quinquespinosus</i> |
| <i>Symphotrichum novae-angliae</i> (Neuengland-Aster) | <i>heriades truncorum</i> | <i>Stachys recta</i> (Aufrechter Ziest) | <i>Anthophora furcata</i> <i>Osmia andrenoides</i> <i>Rhophites alirus & quinquespinosus</i> |
| <i>Tanacetum balsamita</i> (Balsamkraut) | <i>Colletes similis</i> | <i>Stachys sylvatica</i> (Wald-Ziest) | <i>Anthophora furcata</i> |
| <i>Tanacetum parthenium</i> (Römische Kamille) | <i>Colletes daviesanus</i> <i>Hylaeus nigrinus</i> | <i>Taraxacum laevigatum</i> (Sand-Löwenzahn) | <i>Andrena taraxaci</i> |
| <i>Tanacetum vulgare</i> (Rainfarn) | <i>Andrena denticulate</i> <i>Colletes daviesanus, fodiens, similis</i> <i>Heriades truncorum</i> <i>Hylaeus nigrinus</i> <i>Osmia spinulosa</i> | <i>Taraxacum officinale</i> (Wiesen-Löwenzahn) | <i>Andrena fulvago, humilis & taraxaci</i> |
| <i>Telekia speciosa</i> (Große Telekie) | <i>Osmia spinulosa</i> | <i>Teucrium chamaedrys</i> (Edel-Gamander) | <i>Anthophora furcata</i> <i>Osmia andrenoides</i> |
| <i>Thlaspi arvense</i> (Acker-Hellerkraut) | <i>Andrena niveata & suerinensis</i> | <i>Teucrium montanum</i> (Berg-Gamander) | <i>Osmia andrenoides</i> |
| <i>Thlaspi Montana</i> (Berg-Hellerkraut) | <i>Andrena tscheki</i> | <i>Torilis japonica</i> (Gew. Klettenkerbel) | <i>Andrena nitidiuscula</i> |
| <i>Tragopogon pratensis</i> (Wiesen-Bocksbart) | <i>Andrena fulvago & humilis</i> | <i>Trifolium spec.</i> (Klee) | <i>Osmia acuticornis & loti</i> |
| <i>Tripleurospermum perforatum</i> (Geruchlose Kamille) | <i>Colletes daviesanus, fodiens & similis</i> <i>Heriades truncorum</i> <i>Hylaeus nigrinus</i> | <i>Trifolium alpestre</i> (Alpen-Klee) | <i>Eucera longicornis</i> |
| <i>Tripolium pannonicum</i> (Strand-Salzaster) | <i>Colletes halophilus</i> | <i>Trifolium arvense</i> (Hasen-Klee) | <i>Andrena wilkella</i> <i>Colletes marginatus</i> |
| <i>Tussilago farfara</i> (Huflattich) | <i>Andrena taraxaci</i> | <i>Trifolium medium</i> (Mittlerer Klee) | <i>Eucera longicornis</i> <i>Melitta leporina</i> |
| <i>Ulex europaeus</i> (Stechginster) | <i>Andrena wilkella</i> | <i>Trifolium pretense</i> (Rot-Klee) | <i>Andrena gelriae, similis & wilkella</i> <i>Eucera longicornis & nigrescens</i> <i>Melitta leporine & clavicornis</i> |
| <i>Vicia faba</i> (Ackerbohne) | <i>Andrena wilkella</i> | <i>Trifolium repens</i> (Weiß-Klee) | <i>Andrena wilkella</i> <i>Colletes marginatus</i> <i>Eucera interrupta, longicornis & nigrescens</i> <i>Melitta leporine & clavicornis</i> <i>Osmia gallarum</i> |
| <i>Vicia sativa</i> (Saat-Wicke) | <i>Eucera nigrescens</i> | | |
| <i>Vicia villosa</i> (Zottel-Wicke) | <i>Osmia acuticornis</i> | | |